

Pasientens navn:

Legens navn:

Legens telefonnummer:

Dato for oppstart av Inflectra-behandling:

Nåværende administrering:

Det er viktig at du og legen din noterer ned handelsnavnet og batchnummeret til legemidlet som blir gitt til deg.

Handelsnavn:

Batchnummer:

Be legen din notere type og dato for den/de siste undersøkelsen(e) for tuberkulose (TB) under:

Test:

Test:

Dato:

Dato:

Resultat:

Resultat:

Lag deg også en liste over alle andre legemidler som du bruker og ta denne med til ethvert besøk hos lege.

Liste over andre legemidler:

Liste over allergier:

Pasientkort

Inflectra™ 100 mg

pulver til konsentrat til
infusjonsvæske, oppløsning

infliximab



Vis dette kortet til enhver lege som er involvert i din behandling.

Dette pasientkortet inneholder viktig sikkerhetsinformasjon som du må være oppmerksom på før og under behandling med Inflectra.

Vennligst les pakningsvedlegget til Inflectra, som kan søkes opp på www.felleskatalogen.no, nøye før du før du starter å bruke dette legemidlet.

Infeksjoner

Før Inflectrabehandling

- Informer legen din dersom du har en infeksjon selv om den er mindre alvorlig
- Det er veldig viktig at du informerer legen din dersom du noen gang har hatt tuberkulose (TB), eller hvis du har vært i nær kontakt med noen som har hatt TB. Legen din vil teste deg for å se om du har TB. Be legen din notere type og dato for din(e) siste undersøkelse(r) for TB på kortet

- Informer legen din dersom du har hepatitt B eller hvis du vet eller mistenker at du er bærer av hepatitt B-viruset

Under Inflectrabehandling

- Informer legen din umiddelbart dersom du har tegn på en infeksjon. Tegnene inkluderer feber, tretthetsfølelse, (vedvarende) hoste, kortpustethet, vekttap, nattesvette, diaré, sår, tannproblemer, svie ved vannlating eller influensalignende symptomer

Hjertesvikt

Før Inflectrabehandling

- Informer legen din dersom du har noen hjerteproblemer, slik som mild hjertesvikt

Under Inflectrabehandling

- Informer legen din umiddelbart dersom du merker tegn på et hjerteproblem. Tegnene inkluderer kortpustethet, hevelse i føttene eller endringer i hjerteslagene dine

Graviditet og vaksiner

- Hvis du fikk Inflectra da du var gravid er det viktig at du informerer legen til barnet ditt om dette før barnet ditt får noen vaksiner. Barnet ditt bør ikke få en «levende vaksine», slik som BCG (brukes til å forebygge tuberkulose) før 6 måneder etter fødselen

Ha dette kortet med deg i 4 måneder etter din siste dose med Inflectra, eller ved graviditet, i minst 6 måneder etter fødselen av barnet ditt. Bivirkninger kan oppstå i lang tid etter din siste dose.

Når et nytt kort tas i bruk, behold dette kortet som referanse i 4 måneder etter din siste dose med Inflectra.

